

## 新型コロナウイルス感染症に対する安全対策へのご協力をお願い

2020年11月25日

臍帯血を提供いただくみなさまへ

現在、世界各国で新型コロナウイルスによる感染症が発生しております。

日本赤十字社は臍帯血移植による感染被害を防止するため、従前より、海外帰国（入国）後4週間経過していない方には臍帯血提供をご遠慮いただいております。

2020（令和2）年12月1日からは、さらなる安全対策として、以下のとおり臍帯血の受入を制限することとしましたので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

### 1 安全対策の実施内容

新型コロナウイルスの体内での潜伏期間を考慮し、以下のいずれかの条件に該当する方は、臍帯血提供をご遠慮いただくようお願いいたします。

- (1) 今までに新型コロナウイルス感染症と診断された、または新型コロナウイルス検査（PCR、抗原または抗体検査）で陽性になったことがある方
- (2) 新型コロナウイルス感染症が疑われ、PCR または抗原検査を受けた結果は陰性だが、検体採取日から4週間以内の方
- (3) 何らかの理由で新型コロナウイルス検査を受け、直近の結果が判明していない方
- (4) 現在、発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含む新型コロナウイルス感染症を疑う症状のある方
- (5) 4週間以内に新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者とされた方（保健所からの連絡、もしくはCOCOAによる通知を含む）
- (6) 味覚・嗅覚の違和感を自覚する方
- (7) 海外から帰国して「4週間以内」の方

※1 発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐など

※2 「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」の感染可能期間（発症2日前\*から入院や自宅待機を開始するまでの間）に接触した方のうち、次の範囲に該当する方です。

\* 「無症状病原体保有者」の場合は、「検体採取2日前」とする。

- ・ 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった方

- ・ 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた方
- ・ 患者（確定例）の気道分泌液若しくは体液等の汚染物質に直接接触した可能性が高い方
- ・ 手で触れることの出来る距離（目安として1メートル）で、必要な感染予防策なしで、「患者（確定例）」と15分以上の接触があった方

（国立感染症研究所「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」

（2020年5月29日暫定版）参照）

## 2 臍帯血提供にご協力いただいた方へ

以下に当てはまる場合は、氏名、生年月日、分娩施設をできるだけ早く臍帯血バンクにご連絡をお願いいたします。

臍帯血採取後4週間以内に

- （1）新型コロナウイルス検査（PCR、抗原または抗体検査）が陽性となった。
- （2）医療機関で「新型コロナウイルス感染症」と診断された、または「新型コロナウイルス感染症の疑い」とされPCRまたは抗原検査を受けた。
- （3）息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがあった（医療機関を受診し、新型コロナウイルスPCRまたは抗原検査を受けた場合を含む）
- （4）発熱及び咳・呼吸困難などの急性の呼吸器症状を含めた新型コロナウイルス感染症を疑う症状全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐などがあった。（医療機関を受診し、新型コロナウイルスPCRまたは抗原検査を受けた場合を含む）
- （5）保健所からの連絡、もしくは接触確認アプリCOCOAによる通知があり、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者とされた方（医療機関を受診し、新型コロナウイルスPCRまたは抗原検査を受けた場合を含む）

## 3 その他

今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、安全対策の内容を変更する場合があります。

◎参考情報リンク

- ・ 厚生労働省（新型コロナウイルス感染症について）

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708\\_00001.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html)

- ・ 国立感染症研究所（新型コロナウイルス感染症(COVID19)関連情報

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html>